

ÆGIS
Pastilla



AEGIS PASTILLA

Inóculo de hongos micorrizícos en pastilla. Para una dosificación exacta en cultivos hortícolas y florales

AEGIS PASTILLA brinda una solución eficaz de los problemas referentes a la facilidad de aplicación de las micorrizas; además, su fórmula permite alcanzar una excelente relación entre cantidad de esporas, capacidad de micorrización y dosis.



COMPOSICION

| | |
|-----------------------------------|--|
| • Núm. de propágulos por pastilla | 250 |
| • pH | 7 |
| • Peso específico | 0,7 kg/litro (1 pastilla = 5 g aprox.) |
| • Formulación | pastilla |

CULTIVOS Y DOSIS

Aplicación en los cultivos hortícolas en invernadero. Dosis: 1 pastilla por planta.
Emplear también para viveros, en los cuales el cubicaje de las macetas es muy variable.
Dosis: 1 pastilla por planta.

ENVASES

Envase de 500 pastillas
(1 bolsita bajo vacío).
Envase de 4000 pastillas
(8 bolsitas bajo vacío).

ÆGIS
Glomus
Intraradices
Hydro



AEGIS HYDRO

Inóculo de hongos micorrizícos en polvo mojable. Polvo mojable

AEGIS HYDRO coloniza las raíces y extendiéndose hasta al exterior amplía el sistema radicular, absorbiendo mayores cantidades de nitrógeno, fósforo, microelementos y agua. El *Glomus intraradices*, instalándose en el interior y exterior de las raíces, forma un manto protector contra los hongos patógenos y los ataca directamente, impidiendo su instalación así como sus efectos perjudiciales.



COMPOSICION

| | |
|--------------------------------|------|
| • Núm. de propágulos por gramo | 1000 |
| • Boro (B) hidrosoluble | 0,7% |
| • Hierro (Fe) hidrosoluble | 2,1% |
| • Manganeseo (Mn) hidrosoluble | 2,6% |
| • Zinc (Zn) hidrosoluble | 3,2% |

CULTIVOS Y DOSIS

Hortícolas. Micorrización en invernadero: esparcir el producto inmediatamente antes del trasplante colocándolo lo más cerca posible o en contacto con las raíces de las plantas, o bien, diluir este producto en agua (mínimo: 1 litro Aegis Hydro / 20 litros de agua) y proceder al riego con la suspensión. Dosis: 30-40 litros/1000 m².

Micorrización en el campo: esparcir el producto en el acto de la siembra o del trasplante (puede mezclarse con el herbicida de suelo). Dosis: 10-15 l por hectárea.

Micorrización en vivero: mezclar uniformemente AEGIS HYDRO con el mantillo.
Dosis: 10-15 l cada 1000 l de mantillo (1 m³).

Cereales, remolacha y cultivos industriales en general. Esparcir el producto por medio del microgranulador en el acto de la siembra, haciéndolo llegar lo más cerca posible de la semilla (puede mezclarse con el geoherbicida).

Frutales. Poner el producto a contacto con las raíces en el momento del trasplante.
Dosis: 10-15 cm³ cúbicos por planta (10-15 l/ha aproximadamente).

Viñedos. Poner el producto a contacto con las raíces en el momento del trasplante.
Dosis: 5-10 cm³ por planta (20-40 l/ha aproximadamente en relación con la densidad).

ENVASES

Cubo de 5 litros.